



ไทย ปรองดองชีวิต

www.thailife.com

นางนวล

ปีกอิสระแห่งบางปู

สนใจเรื่องราวของธรรมชาติ
ใกล้ๆ เมืองที่บางปู สามารถติดต่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
164 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 709 5005,
โทรสาร. 02 323 3073
BNEC@wwfthai.org
www.wwfthai.org



สิ่งพิมพ์นี้พิมพ์จากกระดาษ ประเภทอาร์ตด้าน 130 แกรม
กระดาษจากไม้ปลูก ไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ




ต้นฤดูหนาวพร้อมกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ชุ่มน้ำบางปูจะเปี่ยมชีวิตชีวาด้วยเหล่าผู้มาเยือน ซึ่งเดินทางไกลมาจากแผ่นดินตอนเหนือ ที่สร้างสีสันให้กับบางปู ก็คือนกนางนวลธรรมดา จากการสำรวจโดยองค์การพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติประจำประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยพบว่า บางปู มีนกนางนวลธรรมดาอาศัยอยู่ตลอดฤดูหนาวไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว อาจกล่าวได้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของนกนางนวลธรรมดามากที่สุดที่พบในแถบอ่าวไทยตอนใน

นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) เป็นนกน้ำขนาดกลาง 41-45 ซม. มีสีขาวเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นหลัง คอ ใหญ่ เป็นสีเทาจางๆ จะงอยปากสีแดงคล้ำ ปลายปากสีดำ แต่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อน



ตั้งแต่เดือนมีนาคม นกเต็มวัย ที่อายุ 2 ปีขึ้นไป จะผลัดเป็นขนชุดฤดูร้อน โดยส่วนหัวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม จะงอยปากและเท้าเปลี่ยนเป็นสีแดงสด เตรียมเดินทางกลับไปผสมพันธุ์ สร้างรัง วางไข่ บริเวณทะเลสาบตอนกลางของทวีปเอเชีย



- พื้นที่สร้างรังในฤดูร้อน
- พื้นที่สร้างรังในฤดูหนาว

แผนที่ แหล่งทำรัง และขอบเขตแพร่กระจายนกนางนวลธรรมดา

นกนางนวลธรรมดา เป็นนกที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัว สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จึงยังมีประชากรในธรรมชาติค่อนข้างมาก พบหากินในเขตน้ำตื้นทั้งตามชายฝั่งทะเล แม่น้ำขนาดใหญ่ ตลอดจนหนองบึง ทะเลสาบน้ำจืด กินอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่ปลาขนาดเล็ก สัตว์น้ำอื่นๆ ไปจนถึงซากสัตว์ เศษอาหารจากมนุษย์ นกนางนวลธรรมดาเรียนรู้วิธีหาอาหารร่วมกับมนุษย์ โดยพบเป็นฝูงใหญ่บินตามเรือประมงที่กำลังล้อมวนเพื่อจับปลา

ความสำเร็จในการปรับตัวของนกในวงศ์นกนางนวล มาจากการผสมผสานจุดเด่นของนกหลายชนิด คือ จะงอยปากแข็งแรง ตรงแหลม จะงอยปากบนรุ่มลงเล็กน้อย ผสมกับสายตาสีดำที่คมจากนกในวงศ์เหยี่ยว ช่วยให้โฉบลงจับปลาที่ผิวน้ำได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงโฉบอาหารที่มนุษย์โยนให้ได้อย่างมั่นคง

ปีกยาวและแข็งแรง เมื่อกางออกยาวกว่าความยาวลำตัว จึงบินเก่ง ที่นิ้วเท้ามีพังผืดแบบเปิด ช่วยในการพยุ่น้ำ ช่วงขยายกว่านก



ในวงศ์เป็ด ไม่ชอบเดิน ชอบลอยนิงๆ อยู่ในน้ำ ลอยตัวไปตามตามแรงคลื่น บางครั้งจะรีเข้ามาจิกกินอาหารเป็นระยะทางสั้นๆ เท่านั้น ยามพักผ่อนมักรวมกันเป็นฝูงใหญ่ ยืนนิงตามสันทราย ค้นดินหรือเสากลางน้ำ โดยไม่เกาะบนต้นไม้ เนื่องจากถิ่นสร้างรังวางไข่ของนกนางนวลธรรมดา เป็นทุ่งหญ้าแฉ่งแฉ่งแทบไม่มีไม้ใหญ่ มันจึงคุ้นเคยกับรูปแบบชีวิตดังกล่าว

น

กนางนวลธรรมดา เดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า 3,000 ไมล์ จากแหล่งสร้างรัง บริเวณที่ราบสูงตอนในของทวีปเอเชีย แถบทิเบต คาซัคสถาน จีนตอนเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย อพยพลงใต้ในฤดูหนาว มาอาศัยตามแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่อิหร่าน ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ไปจรดคาบสมุทรเกาหลี ในประเทศไทย พบทั้งฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนเมษายน ก็ทยอยเดินทางกลับให้ทันฤดูวางไข่ที่เริ่มในราวเดือน พ.ค. โดยจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ปะปนกับฝูงนกนางนวลแกลบธรรมดา (Common Tern) สร้างรังติดกันเป็นแพ ตามริมทะเลสาบ หรือบนพื้นดินรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ ใช้เวลากกไข่ ราว 24 วัน ลูกนกจึงฟักเป็นตัว จากนั้นใช้เวลาอีกราว 3 เดือน ก่อนฤดูหนาวมาถึง นกรุ่นเหล่านี้ก็พร้อมออกเดินทางไกล อพยพลงใต้พร้อมกับพ่อแม่ นกนางนวลธรรมดามีความผูกพันกับแหล่งหากินในฤดูหนาวอย่างมาก สามารถจดจำจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นเพียงตำแหน่งเล็กๆ บนแผนที่ได้อย่างแม่นยำ นกตัวเดิมจะพาลูกๆ กลับมาที่บางปูเป็นประจำทุกปี และนกรุ่นถัดมาก็จะพาลูกๆ ของมันมายังสถานที่แห่งนี้เช่นกัน

ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่า นกนางนวลเดินทางมาอาศัยที่บางปูในฤดูหนาวมานานเพียงใด แต่เมื่อเริ่มสร้างสถานตากอากาศบางปู เมื่อ พ.ศ. 2482 ก็พบว่า มีนกนางนวลมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว

ก่อนเดินทางกลับ นกนางนวลจะต้องเร่งสะสมพลังงานอย่างเต็มที่สำหรับการเดินทางไกล มันจึงกินอาหารไม่เลือกและหากิน ตลอดวัน โชคดีที่บางปูเป็นแหล่งที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่ช่วยให้พวกมันพร้อมสำหรับการเดินทางไกล หากระบบนิเวศที่บางปูเปลี่ยนแปลงไป นกนางนวลธรรมดา กลุ่มใหญ่ที่สุดของอ่าวไทยตอนในเหล่านี้ ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย



บางปู บ้านของนกน้ำ

ท่ามกลางฝูงนกนางนวลธรรมดาหลายพันตัว ที่บางปูยังมีนกนางนวลชนิดอื่นร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ นกนางนวลขอบปีกขาว (Common Black-headed Gull) ซึ่งมีขนาดย่อมกว่านกนางนวลธรรมดาเล็กน้อย สีสันใกล้เคียงกัน แต่ปากและขามีสีเหลืองส้ม ไม่ใช่สีแดงคล้ำ ปากยังเรียวกว่า และจุดเด่นอีกประการคือ แถบสีดำที่ปลายปีกบางกว่านกนางนวลธรรมดา

นอกจากนี้ยังมีนกนางนวลหายากในระดับโลกปะปนมาบ้าง ได้แก่ นกนางนวลปากเรียว (Slender-billed Gull) นกนางนวลหางดำ (Black-tailed Gull) นกนางนวลหัวดำใหญ่ (Great Black-headed Gull) นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย (Heuglin's Gull) เป็นต้น

บางปู ยังเป็นแหล่งหากินของนกชายเลนอพยพ ที่เดินทางเข้ามาในฤดูหนาว นกบางส่วนใช้เป็นจุดแวะพัก 1-2 วันก่อนออกเดินทางลงใต้ไปไกลถึงอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย แต่อีกไม่น้อยที่เลือกอาศัยอยู่ที่นี้ตลอดฤดูหนาว นกอพยพเหล่านี้พบเห็นได้ตามหาดโคลน และบึงน้ำตื้นภายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ได้แก่ นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกชายเลนปากโค้ง นกปากแอมทางดำ นกทะเลขาแดงธรรมดา นกทะเลขาเขียว นกชายเลนบึง นกอีโก้ยเล็ก นกกระสานวล นกเหล่านี้ดึงดูดให้นักดูนกเดินทางมาดูนกที่นี่กันอย่างสม่ำเสมอตลอดฤดูอพยพ

และเมื่ออย่างเข้าสู่ฤดูฝน นกอพยพจะเดินทางกลับไปสร้างรังวางไข่ยังแผ่นดินตอนเหนือ คงเหลือแต่นกประจำถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำบางปูนับสิบชนิด สภาพธรรมชาติของที่นี่ยังคงมีชีวิตชีวา นกประจำถิ่นเหล่านี้ เริ่มสร้างรัง วางไข่ในราวปักษ์หลังของเดือนพฤษภาคม นกเด่นที่พบได้บ่อยได้แก่ นกตีนเทียน มักพบทำรังบนพื้น ในพงหญ้า ริมบึงน้ำ เมื่อมีผู้บุกรุกไปใกล้รัง พ่อแม่นกจะส่งเสียงดังบินวนเวียน บางครั้ง

แผนที่เส้นทางอพยพของนกน้ำ
เส้นทางเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย



แกลังทำเป็นปีกหัก
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้
บุกรุกให้ออกห่างจากรัง

บนเรือนยอดของต้น
เสม พบนกน้ำเล็ก นกยาง
ควาย นกยางเปีย นกแขวก
นกทำรังบนยอดไม้ โดยใช้กิ่งไม้
เล็กๆ ขัดกันหยาบๆ ไปด้วยเศษหญ้าต่อ
เนื่องกันนับร้อยรัง ขณะเดียวกัน ยังมีรายงานการพบเห็นนก
กระสานวล ซึ่งเป็นนกในวงศ์นกยางขนาดใหญ่ ทดลองคาบกิ่ง
ไม้มาสร้างรังในพื้นที่ด้วย บางปูจึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้เมืองไม่กี่
แห่งที่เหลืออยู่ที่สามารถพบเห็นนกน้ำขนาดใหญ่ชนิดนี้ได้

บางปู จึงมิได้เป็นเพียงสถานตากอากาศใกล้เมืองเท่านั้น แต่
ยังเป็นถิ่นอาศัยที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอีกมากมายเนื่องจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไม่มากนัก เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะนกนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่น และ
นกที่เดินทางไกลมาจากอีกซีกโลกหนึ่ง